

घाँटीको भित्री र्याल वा स्पटम संकलनका निर्देशनहरू


नमूना संकलनको लागि समय: उठेपछि दाँत माइनु, खानु-पिउनु अघि

गहिरो घाँटीको र्याल नमूना: प्राथमिक रूपमा बिहान सबेरैको नमूना तर बिहान सबेरै नभएको नमूना पनि स्वीकार्य हुन्छ।

प्रक्रिया :



1. नमूनालाई लेबल सहितको बोटल, भरेको प्रयोगशाला फारम, दुईवटा नमूना झोलाहरू र सफा टेबलमा टिश्यु पेपरको साथमा सामाग्री तयार पार्नुहोस्



2. साबुन र पानीले हातको सरसफाई गर्नुहोस्। यदि अल्कोहलमा आधारित ह्यान्डबल प्रयोग गरिएमा, यो सुक्दा सम्म पखिने कुरा सम्झनुहोस्



3. नमूना बोटल र नमूना झोला खोल्नुहोस्



4. घाँटीको भित्रबाट र्याल सफा गर्न "Kruuua" को आवाज निकाल्नुहोस्*



5. सर्जिकल मास्क हटाउनुहोस्



6. र्याल वा खकारलाई नमूना बोटलमा थुक्नुहोस् । बोटलको ढक्कन राम्रोसँग बन्द गर्नुहोस् ।
7. साबुन र पानी / अल्कोहलमा आधारित ह्यान्डबले हातको सरसफाई गर्नुहोस्



8. सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
9. साबुन र पानी / अल्कोहलमा आधारित ह्यान्डबले हातको सरसफाई गर्नुहोस्



10. चुहावट रोक्नको लागि नमूना बोटलको ढक्कन बन्द गर्न बेस्सरी कस्नुहोस् र टिश्यु पेपरले बोटलको सतहलाई सफा गर्नुहोस् । सतहलाई सफा गर्न अल्कोहलका प्याडहरू प्रयोग नगर्नुहोस्



11. नमूना बोटललाई पहिलो नमूना झोलामा राख्नुहोस्



12. नमूना बोटल राखेको पहिलो नमूना झोलालाई प्रयोगशाला फारम सँगै दोस्रो नमूना झोला भित्र राख्नुहोस् । बोटललाई सधैं ठाडो राख्नुहोस् । साबुन र पानी अल्कोहलमा आधारित ह्यान्डबले हातको सरसफाई गर्नुहोस्

*खकारको लागि: धेरै पटक गहिरो साँस लिनुहोस् र खोकेर खकार निकाल्नुहोस् । खकारलाई मुख भित्र रोकेर राख्नुहोस् ।

